



Dr.med.vet.Sabine Fischer

Fachtierärztin für Innere Medizin
Zusatzbezeichnung Verhaltenstherapie

Dr. S. Fischer, Vollerweg 21, 85253 Erdweg

Seite : 1
Besitzer: 13887 Kaninchenhilfe Bayern Rockt e.V., Lindenstr. 19, 85247 Schwabha
Patient : 147 Heimtier, Toni, Kaninchen, mk, 05.2022

Version-LDT : 07/99

Dr. Sabine Fischer
Vollerweg 21
85253 Erdweg
Labor : Vet-Med-Labor

Kunden-(Arzt-)Nummer : ENDD
Erstelldatum : 23.11.2023

Anforderungs-Ident : 70663658
Auftragsnummer Labor : VB058537

Labor-Datum : 20.11.2023
Bericht-Datum : 23.11.2023
Name : Kaninchenhilfe Bayern Rockt
Vorname : Kaninchen Toni
Geb.-Datum : 00000000

Befundart: vorläufiger Befund

Pat.-Info : 70663658
Geschlecht: männlich

Kultur auf darmpathogene Keime

Bitte beachten Sie: Zusätzliche Untersuchungen aus Kotproben können innerhalb von 2 Tagen nach Probeneingang angefordert werden.

Kultur

Escherichia coli 1)

E.coli ist ein Bestandteil der physiologischen Darmflora von Kaninchen und Hasen. Zu einer Erkrankung kommt es i.d.R. in Verbindung mit einer primären, durch Parasitenbefall, Fütterungsfehler u.{. hervorgerufenen Darmstörung, die sekundär zur Überwucherung durch E.coli führt.

(In möglicher Keimzahl)

leicht erhöht

Darmpathogene Keime

Test-Status: fehlt/folgt

noch nicht differenzierter Keim

Hierbei kann es sich um fakultativ oder obligat pathogene Erreger oder um irrelevante Erreger (apathogen oder Standortflora) handeln. Eine Beurteilung ist erst durch weitere Differenzierungsschritte möglich.

(In geringer Keimzahl)

Antibiogramm zu Keim 1)

Ampicillin	S 4
Amoxicillin	S
Amoxicillin+Clavulan	S <=2
Cefalexin	S 8
Cefazolin	S
Cefalotin	S 4
Cefovecin	S <=0.5
Ceftiofur	S <=1
Cefpodoxim	S <=0.25
Cefoperazon	S
Cefquinom	S
Gentamicin	S <=1
Tetracyclin	S <=1
Doxycyclin	S 1
Enrofloxacin	S <=0.12
Marbofloxacin	S <=0.5
Pradofloxacin	S <=0.12
Nitrofurantoin	S <=16
Sulfamethox./Trim.	S <=20
Chloramphenicol	S 4
Florfenicol	S
Imipenem	S <=0.25
Meropenem	S
Amikacin	S <=2

Tobramycin S

Interpretationsschlüssel zum Antibiogramm:

S = sensibel;

Wirkstoff gegenüber Mikroorganismus bei empfohlener Dosierung üblicherweise wirksam.

I = intermediär;
Wirkstoff gegenüber Mikroorganismus ggf. bei höherer als empfohlener Dosis wirksam.

R = resistent;
Wirkstoff gegenüber Mikroorganismus wegen Resistenzmechanismus weder in empfohlener noch in höherer Dosierung wirksam.

Methode: automatisierte Resistenzbestimmung (MHK), nach Richtlinien des Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI). MHK-Werte (soweit verfügbar) angegeben in µg/ml.

SIR-Ergebnisse und / oder MHK-Werte werden nicht angegeben, wenn keine Interpretationskriterien (sog. Breakpoints) nach CLSI verfügbar sind, die Wachstumsbedingungen des Mikroorganismus keine Messwertbestimmung mit der verwendeten Methode erlauben, oder die Bestimmung für das individuelle Isolat nicht möglich war.

Die Ergebnisse werden teilweise durch Ableitung nach internationalen Richtlinien erzielt (Information auf Nachfrage im Labor verfügbar). Das Antibiotogramm ist keimbezogen zusammengestellt. Ein fehlendes SIR-Ergebnis im Antibiotogramm weist i. d. R. auf eine nicht sinnvolle Keim-Wirkstoff-Kombination hin. Bitte beachten Sie auch die Hinweise bezüglich der Leitsubstanzen und Kreuzresistenzen.

Bitte Anwendungsbeschränkungen und Kontraindikationen beachten! Die Auswahl des Antibiotikums liegt in der Verantwortung des behandelnden Tierarztes. Die Testmethode bezieht sich auf systemische Wirkspiegel. Die Testung lokal applizierbarer Wirkstoffe wie Fusidinsäure und Polymyxin B ist nicht möglich. Für mehr Informationen zur MHK besuchen Sie bitte unsere Webseite (Suchwort „MHK“) unter www.idexx.de bzw. www.idexx.at.

Fussnote für Cefovecin:

Cefalosporin der 3. Generation.

Indikatorsubstanz bei Gram-negativen Bakterien für mögliche ESBL-Bildner.

Vor Einsatz bitte nationale Regularien beachten.

Fussnote für Ceftiofur:

Cefalosporin der 3. Generation.

Indikatorsubstanz bei Gram-negativen Bakterien für mögliche ESBL-Bildner.

Vor Einsatz bitte nationale Regularien beachten.

Fussnote für Cefpodoxim:

Cefalosporin der 3. Generation.

Indikatorsubstanz bei Gram-negativen Bakterien für mögliche ESBL-Bildner.

Vor Einsatz bitte nationale Regularien beachten.

Fussnote für Cefoperazon:

Cefalosporin der 3. Generation.

Indikatorsubstanz bei Gram-negativen Bakterien für mögliche ESBL-Bildner.

Vor Einsatz bitte nationale Regularien beachten.

Fussnote für Cefquinom:

Cefalosporin der 4. Generation.

Vor Einsatz bitte nationale Regularien beachten.

Fussnote für Tetracyclin:

Leitsubstanz für alle Tetracycline.

Fussnote für Enrofloxacin:

Leitsubstanz für alle Fluorchinolone.

Vor Einsatz bitte nationale Regularien beachten.

Fussnote für Marbofloxacin:

Vor Einsatz bitte nationale Regularien beachten.

Fussnote für Pradofloxacin:

Vor Einsatz bitte nationale Regularien beachten.

Fussnote für Sulfamethox./Trim.:

Gilt auch für andere Sulfonamid/Trimeth.-Kombinationen.

Fussnote für Chloramphenicol:

Leitsubstanz für alle Fenicole (z.B. Florfenicol).

Fussnote für Imipenem:

Indikatorsubstanz für Carbapenemase-Bildner.

Keine Anwendung bei Tieren.

Seite : 4

Besitzer: 13887 Kaninchenhilfe Bayern Rockt e.V., Lindenstr. 19, 85247 Schwabha

Patient : 147 Heimtier, Toni, Kaninchen, mk, 05.2022

Bitte nationale Regularien beachten.

Fussnote f}r Meropenem:

Indikatorsubstanz f}r Carbapenemase-Bildner.

Keine Anwendung bei Tieren.

Bitte nationale Regularien beachten.